

湖南省农业委员会办公室文件

湘农办植〔2017〕100号

湖南省农业委员会办公室 关于发布《湖南省主要农作物有害生物防控科学用药推荐名录（第三次修订）》的通知

各市州农业委员会：

为贯彻落实农业部《到2020年农药使用量零增长行动方案》（农农发〔2015〕2号）文件精神，大力推进主要农作物有害生物科学防控，确保农业生产、农产品质量和生态环境安全，依据《中华人民共和国农药管理条例》、《湖南省植物保护条例》有关规定，按照高效低毒、环境友好的原则，我委在试验、示范和大面积应用的基础上，结合全省实际，提出《湖南省主要农作物

有害生物防控科学用药推荐名录（第三次修订）》（见附件）。请各级农业植保部门结合本地实际，从中选择相关产品向广大农业生产经营经营者推介。同时，要切实抓好对推介品种用量、用法和农药安全间隔期等科学用药知识的宣传普及工作，提升科学用药水平。

附件：湖南省主要农作物有害生物防控科学用药推荐名录

湖南省农业委员会办公室

2017年5月16日

作物	防治对象	推介品种
水稻	稻瘟病	三环唑（可湿性粉剂应在 75%以上）、稻瘟灵（40%以上）、嘧菌酯（25%以上）、吡唑醚菌酯（微囊悬浮剂）、枯草芽孢杆菌（1000 亿 PIB/g 以上）、春雷霉素（2%以上）、肟菌·戊唑醇、春雷·噻唑锌、春雷·三环唑
	纹枯病	己唑醇（10%以上）、戊唑醇、噻呋酰胺、嘧菌酯、氟环唑、井冈霉素（20%以上）、申嗪霉素（1%以上）、井冈·蜡芽菌（12.5% 以上）、苯甲·丙环唑、肟菌·戊唑醇、苯甲·嘧菌酯、丙环·嘧菌酯
	稻曲病	戊唑醇、氟环唑、丙环唑（25%以上）、苯甲·丙环唑、井冈·蜡芽菌（12.5%以上）、肟菌·戊唑醇
	稻飞虱	吡蚜酮、噻虫嗪（25%以上，不用于褐飞虱）、吡虫啉（20%以上，不用于褐飞虱）、呋虫胺、三氟苯嘧啶、氟啶虫胺腓、烯啶虫胺（20%以上）、吡蚜酮·烯啶虫胺、吡蚜酮·异丙威（50%以上）
	稻纵卷叶螟	氯虫苯甲酰胺、四氯虫酰胺、茚虫威、阿维菌素（1.8%以上）、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（2%以上）、苏云金杆菌（8000IU/mg 以上）、短稳杆菌（100 亿孢子/毫升以上）、阿维·氯苯、甲维·茚虫威
	二化螟	氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、丁虫腓、阿维菌素（1.8%以上）、甲氧虫酰胺、乙多·甲氧虫、阿维·甲氧虫、阿维·氯苯
水稻直播田	杂草	丙草胺（应含安全剂）、五氟磺草胺、氰氟草酯、二氯喹啉酸、噁唑酰草胺、双草醚、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、灭草松、噁唑酰草胺·氰氟草酯、苄嘧·丙草胺（应含安全剂）、二甲·灭草松
水稻抛秧田	杂草	丁草胺、丙草胺、苄嘧酰草胺、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、氰氟草酯、双草醚、苄·丁、苄嘧·丙草胺、苄嘧·苄嘧酰、吡嘧·苄嘧酰
水稻移栽田	杂草	苄·乙、苄·丁、苄嘧·丙草胺
种子处理	水稻苗期病虫害	噻虫嗪、咪鲜胺、戊唑醇、咯菌腓、氰烯菌酯、咪鲜·吡虫啉
柑橘	疮痂病	代森锰锌、硫酸铜钙、噻菌铜、百菌清、嘧菌酯、苯醚甲环唑
	溃疡病	噻唑锌、噻菌铜、松脂酸铜、氢氧化铜、春雷·王铜、硫酸铜钙
	炭疽病	代森锰锌、氟硅唑、丙森锌、甲基硫菌灵、溴菌腓、咪鲜胺、嘧菌酯
	树脂病（砂皮病）	氟硅唑、克菌丹、代森锰锌

柑橘	大(小)实蝇	阿维菌素(饵剂)、多杀霉素(诱剂)
	红蜘蛛	螺螨酯、哒螨灵、炔螨特、乙螨唑、氟虫脲、阿维·炔螨特、阿维·达螨灵、阿维·噻螨酮
	锈壁虱	唑螨酯、氟虫脲、虱螨脲、阿维菌素、螺螨酯、代森锰锌(80%以上)、阿维·炔螨特
	木虱	吡丙醚、噻虫嗪、高效氟氯氰菊酯、阿维·啉虫胺
	蚧类	氟啶虫胺腈、噻嗪酮、螺虫乙酯、烟碱·苦参碱
	潜叶蛾	阿维菌素、溴氰菊酯、氟虫脲、灭幼脲、高效氯氰菊酯
蔬菜	霜霉病、疫病	烯酰吗啉、啉氧菌酯、吲唑磺菌胺、啞菌酯、霜霉威盐酸盐、烯酰·啞啞菌、氟菌·霜霉威
	灰霉病	异菌脲、啞霉胺、啉酰菌胺
	炭疽病	克菌丹、代森锰锌、啞菌酯、甲硫·福美双
	软腐病	啞菌铜、啞森铜、啞唑啉
	枯萎病	啞霉素、咪鲜胺、甲基硫菌灵
	青枯病	多粘类芽孢杆菌、蜡质芽孢杆菌、啞森铜
	白粉病	氟吡菌酰胺、戊唑醇、枯草芽孢杆菌(100亿PIB/g以上)、啞菌酯(50%以上)、甲基硫菌灵、肟菌·戊唑醇、吡啶·啞菌酯
	锈病	戊唑醇、苯醚甲环唑、腈菌唑、苯甲·丙环唑、苯甲·氟酰胺
	菜青虫、烟青虫	阿维菌素、苏云金杆菌(16000IU/mg以上)、茚虫威、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、溴氰菊酯、氯虫苯甲酰胺、多杀菌素
	甜菜夜蛾、斜纹夜蛾	溴氰虫酰胺、茚虫威、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、氯虫苯甲酰胺、氟啶脲、斜纹夜蛾核型多角体病毒(200亿PIB/g以上)
	小菜蛾	氯虫苯甲酰胺、乙基多杀菌素、茚虫威、苏云金芽孢杆菌(16000IU/mg以上)、阿维·茚虫威
粉虱类	噻虫嗪、吡虫啉(20%以上)、啉虫脒、氟啶虫胺腈、呋虫胺	
蚜虫	啉虫脒、吡蚜酮、噻虫嗪、吡虫啉、烯啶虫胺、鱼藤酮	
马铃薯	晚疫病	代森锰锌、氟吗啉、烯酰吗啉、吲唑磺菌胺、啞菌酯、霜脲·锰锌、精甲霜·锰锌
油菜	菌核病	多菌灵、异菌脲、腐霉利、咪鲜胺、甲基硫菌灵、腐霉·福美双
玉米	大、小叶斑病	肟菌·戊唑醇、丙环·啞菌酯、啞醚·氟环唑
	玉米螟	苏云金芽孢杆菌、甲氨基阿维菌素苯甲酸、溴氰菊酯

	蚜虫	噻虫嗪、吡虫啉、氟虫腈
茶叶	茶饼病	多抗霉素
	炭疽病	苯醚甲环唑、氢氧化铜、百菌清、代森锰锌
	小绿叶蝉	茚虫威、丁醚脲、噻嗪酮、呋虫胺、苦参碱、藜芦碱、印楝素、球孢白僵菌、苦参·藜芦碱
	茶尺蠖	茚虫威、除虫脲、苦参碱、短稳杆菌
	茶毛虫	氯菊酯、苦参碱、苏云金杆菌、印楝素
	茶黄螨、茶橙瘿螨	矿物油、藜芦碱
农区	害鼠	0.05%敌鼠钠盐饵剂、40%敌鼠钠盐母粉、0.005%溴敌隆饵剂、0.5%溴敌隆母液、0.005%溴鼠灵饵剂、0.5%溴鼠灵母液、0.005%氟鼠灵饵剂、0.05%杀鼠灵饵剂、3.75%杀鼠醚母粉、0.0375%杀鼠醚饵剂
类型	推荐农药	用途
植物生长调节剂	赤·吲乙·芸苔	调节植物生长，增产
	芸苔素内酯	提高作物的抗力性
	噻苯隆	调节植物生长，增产
	赤霉素	促进茎叶生长，抑制花芽形成
	乙烯利	促进果实成熟，刺激伤流，调节性别转化
	多效唑	延缓植物生长，抑制茎秆伸长
	调环酸钙	促进生育，缩短植物茎秆伸长